

**Πίνακας 10.1** Βλαστική περίοδος και στάδια ανάπτυξης ετήσιων καλλιεργειών όπως διαμορφώνονται στην ηπειρωτική Ελλάδα

Καλλιεργεια	Βλαστική περίοδος και στάδια ανάπτυξης
(1)	(2)
Σιτάρι	Σπορά από 15/10 μέχρι 30/11 ή και αργότερα, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Συγκομιδή από 5-25/6 στα πεδινά και 1-20/7 στα ορεινά. Αντίστοιχες βλαστικές περιόδους (μέσες) 205 και 230 ημέρες. Διάρκεια σταδίων ανάπτυξης στα πεδινά 20/115/50/20 και στα ορεινά 20/140/50/20 (οι αριθμοί αναφέρονται κατά σειρά στα τέσσερα στάδια).
Κριθάρι	Ημερομηνίες σποράς αντίστοιχες με του σιταριού. Συγκομιδή στα πεδινά από 30/5-16/6 και στα ορεινά από 10/6-10/7. Μέση βλαστική περίοδος 190 και 215 ημέρες αντίστοιχα. Στάδια ανάπτυξης στα πεδινά 20/105/45/20 και στα ορεινά 20/130/45/20.
Σιγάλη	Η καλλιέργειά της πολύ περιορισμένη. Σπορά όπως στο σιτάρι και το κριθάρι, συγκομιδή 5 ημέρες πριν το κριθάρι. Στάδια ανάπτυξης στα πεδινά 20/100/45/20 (185) και στα ορεινά 20/125/45/20 (210). (Οι αριθμοί στις παρενθέσεις αναφέρονται στη μέση διάρκεια της βλαστικής περιόδου).
Αραβόσιτος	Ποικιλίες καλαμποκιού προίμες με πλήρη βιολογικό κύκλο σπέρνονται στα πεδινά από 10-30/4 και συγκομίζονται από 5-15/9. Τα στάδια ανάπτυξης είναι 25/40/60/25 (150). Στα ορεινά η σπορά γίνεται 10 ημέρες αργότερα. Στα τενάγη των Φιλίππων, λόγω ειδικών συνθηκών, η σπορά γίνεται το Μάιο και η συγκομιδή τον Οκτώβριο ή ακόμη και το Νοέμβριο. Το επίσπορο καλαμποκιού σπέρνεται γύρω στις 25/6 και χρησιμοποιούνται υβρίδια με βιολογικό κύκλο 100 ημερών. Τα στάδια είναι 15/25/45/15 (100). Καλλιεργείται μόνο στα πεδινά.
Ζαμπάκι	Καλλιεργείται κυρίως στα πεδινά. Ίδανική ημερομηνία σποράς 20-30/4, μπορεί να παραταθεί μέχρι 15/5. Συγκομιδή από 1-20/10 που μπορεί να παραταθεί μέχρι το πρώτο 15θήμερο του Νοεμβρίου. Στάδια ανάπτυξης 30/60/145/25 (140).

**Πίνακας 10.1** (συνέχεια)

(1)	(2)
Ζαχαρότευτλα	Σπορά, ανάλογα με τις εδαφικές και κλιματικές συνθήκες, από 1/3 μέχρι 30/4. Η συγκομιδή γίνεται όταν τα τεύτλα φτάσουν τη μέγιστη περιεκτικότητα σε ζάχαρο. Δεν υπάρχει ευκρινής διάκριση μεταξύ 3ου και 4ου σταδίου. Στάδια ανάπτυξης 30/45/90/15(180).
Φασόλια ξερά	Σπορά στις αρχές Μαΐου, συγκομιδή το δεύτερο 15θήμερο του Αυγούστου για τα πλακέ και από τον Αύγουστο μέχρι αρχές Νοεμβρίου, για τους γιγαντές (κυρίως περιοχή Δ. Μακεδονίας). Στάδια ανάπτυξης 15/25/50/20 (110).
Φασολάκια	Στα πεδινά σπορά Μάιος και Ιούνιος. Συγκομιδή Ιουλίου-Αύγουστος - Σεπτέμβριος. Στάδια ανάπτυξης 20/30/30/10(90).
Πατάτες	Στα πεδινά σπορά 25-30/6, συγκομιδή 1/10-15/11, στάδια ανάπτυξης 25/30/40/25 (120). Στα ορεινά σπορά 15-25/4, συγκομιδή 25/8-25/9, στάδια ανάπτυξης 30/35/50/25 (140).
Ντομάτες, νωπές και βιομηχανικές	Νωπή ντομάτα στα πεδινά μεταφύτευση 1-5/6, συγκομιδή 1/9-30/11, στάδια ανάπτυξης 35/45/70/30 (180), στα ορεινά (όψιμη) μεταφύτευση 25-30/6, συγκομιδή 20/ 9-20/11, στάδια 20/30/30/20 (100). Βιομηχανική ντομάτα στα πεδινά σπορά 15/4-4/6, συγκομιδή 25/7-10/10, στάδια ανάπτυξης 25/35/35/20 (115)συγκομιδή 25/7-10/10, στάδια ανάπτυξης 25/35/35/20 (115).
Πιπεριές	Μεταφύτευση στα πεδινά 1/4-5/5, στα ορεινά 1-31/5. Συγκομιδή Ιουλίου-Αύγουστος-Σεπτέμβριος. Στάδια ανάπτυξης 25/35/35/20 (115).
Κρεμμύδια ξερά	Σπορά 15/2 - 31/3, συγκομιδή 25/6-31/7 στα πεδινά και τον Αύγουστο στα ορεινά. Στάδια ανάπτυξης στα πεδινά 15/ 25/ 60/30 (130) και στα ορεινά 15/25/70/40 (150).
Μπιζέλια	Σπορά νωρίς την άνοιξη, στάδια ανάπτυξης 15/25/35/15 (90). Αρχαίος βιομηχανικός, σπορά 1-10/7, στάδια 10/20/20/10 (60).