

Πίνακας 10.1 (συνέχεια)

(1)	(2)
Πεπόνια, καρπούζια	Σπορά Απριλίου-Μαΐου, συγκομιδή Ιουλίου-Αύγουστος - Σεπτέμβριος-Οκτώβριος, στάδια ανάπτυξης 25/35/40/20 (120).
Λάχανα, κουνουπίδια	Μεταφύτευση Ιουλίου-Αύγουστος, συγκομιδή από τέλος Σεπτεμβρίου μέχρι Φεβρουάριο, στάδιο ανάπτυξης 20/30/20/10 (80).
Μαρούλια	Ανοιξιάτικα, μεταφύτευση 10-15/4, συγκομιδή 15-30/5, στάδια ανάπτυξης 10/15/10/5 (40). Φθινοπωρινά, μεταφύτευση 1/8-30/9, συγκομιδή 1/10-30/11, στάδια ανάπτυξης 15/25/15/10 (65).
Μελιτζάνες	Στα πεδινά, μεταφύτευση 1/4-5/5, συγκομιδή από Ιούνιο μέχρι Οκτώβριο, στάδια ανάπτυξης 20/30/25/15 (90). Στα ορεινά μεταφύτευση 1-31/5, συγκομιδή Αύγουστος-Σεπτέμβριος, στάδια 20/35/35/15 (105).
Σέλινο	Ολόκληρο το χρόνο, στάδια ανάπτυξης 25/40/40/15 (120)
Καρότα	Ολόκληρο το χρόνο, στάδια ανάπτυξης για τις ζεστές εποχές 20/30/30/20 (100), για τις δροσερές εποχές 25/35/40/20 (120).
Καπνός	Μεταφύτευση από 15/4 μέχρι 10/6 ανάλογα με την ποιότητα και την περιοχή. Διάρκεια συγκομιδής περίπου 40 ημέρες. Πέρας συγκομιδής 20/8 μέχρι 10/9 ανάλογα με την ποιότητα και την περιοχή. Στάδια ανάπτυξης 10/20/50/15 (95).

λο αριθμό καλλιιεργειών. Δεδομένου ότι οι τιμές του K_c επηρεάζονται και από τις κλιματικές συνθήκες, για κάθε καλλιιεργεια δίνου τέσσερις τιμές ανάλογα με την ελάχιστη σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας και την ταχύτητα του ανέμου. Οι συντελεστές αυτοί, για ετήσιες καλλιιεργειες που μπορούν να αναπτυχθούν στην Ελλάδα, δίνονται στον Πίνακα 10.2. Οι τιμές του K_c κατά τη διάρκεια του αρχικού, του σταδίου ταχείας ανάπτυξης και του τελικού σταδίου υπολογίζονται με τις διαδικασίες που δόθηκαν παραπάνω. Μετά το πέρας της διαδικασίας προσδιορισμού των τιμών του K_c για όλη τη βλαστική περίοδο, συντάσσονται διαγράμματα που

Οι φητικοί συντελεστές των καλλιιεργειών

Πίνακας 10.2 Φητικοί συντελεστές, K_c , του σταδίου μέσης περιόδου, K_{c3} και συγκομιδής, K_{c4} ετήσιων καλλιιεργειών που μπορούν να αναπτυχθούν στην Ελλάδα, κατά FAO-24

Καλλιιεργεια	Φητικός συντελεστής, K_c	RH _{min}			
		> 70%			
		0-5	5-8	8-11	11-15
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Σιτάρι	K_{c3} K_{c4}	1,05 0,25	1,10 0,25	1,15 0,20	1,15 0,20
Κριθάρι	K_{c3} K_{c4}	1,05 0,25	1,10 0,25	1,15 0,20	1,15 0,20
Σίκαλη	K_{c3} K_{c4}	1,05 0,25	1,10 0,25	1,15 0,20	1,15 0,20
Σόργο	K_{c3} K_{c4}	1,00 0,50	1,05 0,50	1,10 0,55	1,10 0,55
Αραβόσιτος	K_{c3} K_{c4}	1,05 0,55	1,10 0,55	1,15 0,60	1,15 0,60
Βαμβάκι	K_{c3} K_{c4}	1,05 0,65	1,15 0,65	1,20 0,65	1,20 0,65
Ζαχαρότευτλα	K_{c3} K_{c4}	1,05 0,95	1,10 0,95	1,15 1,00	1,15 1,00
Φασόλια ξερά	K_{c3} K_{c4}	1,05 0,30	1,10 0,30	1,15 0,25	1,15 0,25
Φασολάκια	K_{c3} K_{c4}	0,95 0,85	0,95 0,85	1,00 0,90	1,00 0,90
Πατάτες	K_{c3} K_{c4}	1,05 0,70	1,10 0,70	1,15 0,75	1,15 0,75
Ντομάτες	K_{c3} K_{c4}	1,05 0,60	1,10 0,60	1,20 0,65	1,20 0,65