



Κλείδες Τάξεων Εντόμων



Εικ. 1. Έλυτρα (Α), ημιέλυτρα (Β)
και ψευδέλυτρα (Γ)



Εικ. 2. Protura.

- 1** - Ένα ή δύο ζεύγη πτερύγων, εμφανών
ή κρυμμένων κάτω από έλυτρα, ημι-
έλυτρα, ή ψευδέλυτρα (Εικ. 1) 22

- Χωρίς εμφανείς πτέρυγες. Οι
πτέρυγες μπορεί να είναι ατροφικές
και να διακρίνονται ως μικρές
αποφύσεις. Διακρίνονται πολλά
κοιλιακά άρθρα όταν το έντομο
παρατηρείται από τα
νώτα.....

- 2.** - Δεν υπάρχουν κεραίες. Σώμα λεπτό
λευκόχρωμο. Πολύ μικρό μέγεθος (≈ 1
mm) (Εικ. 2).....

- Υπάρχουν κεραίες, μπορεί όμως να
μην διακρίνονται εύκολα.....

- 3** - Συνήθως υπάρχει διχαλωτό όργανο
εκτίναξης (furcula, spring) στην κοιλιά
(Εικ. 3). Μικρό μέγεθος (2-4 mm).
Χωρίς κοιλιακούς κέρκους. Εάν δεν
υπάρχει «furcula» τότε το μέγεθος και
το σχήμα είναι χαρακτηριστικό της
τάξεως των κολλέμβολων.....

- Δεν υπάρχει «furcula» (Εικ. 3). Σώμα
συνήθως μεγαλύτερο από 4 mm, σχήμα
ποικίλο.


2

2

3

Protura**Collembola**

4



Εικ. 3. Collembola.

4. - Στην άκρη της κοιλιάς υπάρχουν κέρκοι μεγάλου μήκους (Εικ. 4) και δεν υπάρχουν άλλα στυλόμορφα κοιλιακά εξαρτήματα. Στην περίπτωση που υπάρχουν κοιλιακά στυλόμορφα εξαρτήματα οι κέρκοι είναι μικροί.....

5

- Δεν υπάρχουν κέρκοι ή είναι μικροί.
Δεν υπάρχουν στυλόμορφα κοιλιακά εξαρτήματα.....

5

5. - Στην κορυφή της κοιλιάς υπάρχουν 3 νηματοειδής κέρκοι (Εικ. 4).....

Diplura

- Στην κορυφή της κοιλιάς υπάρχουν 2 κέρκοι, είτε με τη μορφή λαβίδας, είτε μικρότεροι, αποτελούμενοι από αρθρωτά τμήματα (Εικ. 5).....



Εικ. 5. Diplura.

6. - Στην κορυφή της κοιλιάς υπάρχουν 2 Dermaptera μακριοί κέρκοι, με μορφή λαβίδας, αποτελούμενοι έκαστος από ένα μόνο

7

- Οι κέρκοι (όταν υπάρχουν) δεν έχουν το σχήμα λαβίδας και συνήθως αποτελούνται από αρθρωτά τμήματα

7. - Έντομα μεγάλου μεγέθους (συνήθως > 25 mm σε μήκος). Οι κεραίες συχνά είναι πολύ μακριές και λεπτές.....

8

- Έντομα μικρού μεγέθους, συνήθως < 25 mm)

9

8 - Ταρσός με τέσσερα άρθρα..... **Orthoptera**

-Ταρσός με 5 άρθρα **Phasmida**

9 - Είτε υπάρχουν 2 σωληνοειδής αποφύσεις (σιφώνια, Εικ. 6) που φύονται από το νώτο του 4^{ου} κοιλιακού άρθρου με κατεύθυνση προς το ουραίο τμήμα του σώματος, είτε το σώμα είναι καλυμμένο με κηρώδη σκόνη ή κηρώδη νημάτια ή με μια κατασκευή που μοιάζει με λέπι (ασπίδιο).....




Εικ. 6. Homoptera

- Δεν υπάρχουν σιφώνια και το σώμα δεν καλύπτεται από αποφύσεις ή από ασπίδιο. **10**

10 - Το σημείο ένωσεις μεταξύ κοιλιάς και **Hymenoptera** θώρακα είναι στενό και μοιάζει με λεπτό σωλήνα (μέλισσες, σφήκες, μυρμήγια).....

- Το σημείο ένωσης κοιλιάς και θώρακα δεν είναι στενό. **11**



Εικ. 7. Embiidina.

11 - Το πρώτο άρθρο του ταρσού (πρώτο ταρσομερές) των πρόσθιων ποδιών είναι διογκωμένο σε σχέση με τα άλλα ταρσομερή (Εικ. 7), διαμορφομένο σε όργανο παραγωγής μεταξιού και ύφανσης ιστών (webspiners).....

- Το πρώτο ταρσομερές των πρόσθιων ποδιών δεν είναι διογκωμένο. **12**



Εικ. 8. Thysanoptera

- 12** - Στοματικά μόρια ξέοντος μυζητικού **Thysanoptera** τύπου, διαμορφωμένα σε κοντό κωνικό ρύγχος, πτέρυγες συνήθως με πολλούς κροσσούς, κοιλιά οξύληκτη (Εικ. 8).....

- Στοματικά μόρια όχι ξέοντος μυζητικού τύπου. Μπορεί να έχουν τη μορφή ρύγχους που εκτείνεται προς την κοιλιακή πλευρά της κεφαλής και ίσως με κατεύθυνση προς τα πίσω.....

13

- 13** - Σώμα επίπεδο στα πλευρά με πολλές ακανθόμορφες προεξοχές και κοντές τρίχες που έχουν κατεύθυνση προς το ουραίο μέρος του σώματος, πόδια μακριά με ιδιαίτερα μεγάλο ισχίο (coxa) διαμορφωμένα για άλματα (Εικ. 9).....



Εικ. 9. Siphonaptera.

- Το σώμα δεν είναι επίπεδο στα πλευρά, μπορεί να υπάρχουν ακανθόμορφες προεξοχές και τρίχες που δεν έχουν κατεύθυνση προς το ουραίο τμήμα του σώματος. Εάν τα πόδια είναι πηδητικού τύπου τότε η κνήμη είναι το μεγαλύτερο σε μήκος άρθρο του ποδιού

14

- 14** - Στοματικά μόρια επιμήκη διαμορφωμένα σε διατρητικό μυζητικό ρύγχος

15

- Τα στοματικά μόρια δεν είναι διαμορφωμένα σε ρύγχος, η κεφαλή μπορεί να είναι επιμήκης

16



Εικ. 10. Hemiptera.

15 - Κεραίες όχι ευδιάκριτες ευρισκόμενες σε αυλακώσεις της κεφαλής..... **Siphonaptera**

- Κεραίες μεγάλες, διακρίνονται **Hemiptera** εύκολα (Εικ. 10).....



Εικ. 11. Isoptera.

16 - Σώμα καλυμμένο με πυκνό **Lepidoptera** τρίχωμα.....

- Σώμα χωρίς πυκνό τρίχωμα..... **17**

17 - Κομβοειδής κεραίες, υπάρχουν μικροί κέρκοι στην κοιλία (τερμίτες) (Εικ. 11)..... **Isoptera**

- Μη κομβοειδής κεραίες, απουσία κέρκων..... **18**

18 - Κεραίες μακριές και λεπτές..... **19**

- Κοντές κεραίες..... **20**

19 - Κεφαλή επιμήκης που καταλήγει σε «ράμφος» στο οποίο βρίσκονται τα στοματικά μόρια (Εικ. 12). Στα αρσενικά ορισμένων ειδών η κοιλία έχει μορφή παρόμοια με αυτή των σκορπιών


- Μη επιμήκης κεφαλή **Psocoptera**




Εικ. 12. Mecoptera.

20 - Ταρσός με 4-5 άρθρα..... **Diptera**

- Ταρσός με 1-3 άρθρα (ψείρες)..... **21**



Εικ. 13. Mallophaga.




Εικ. 14. Dermaptera



Εικ. 15. Ephemeroptera.

- 21** - Στοματικά μόρια μασητικού τύπου, κεφαλή συνήθως μεγαλύτερη σε πλάτος απ' ότι σε μήκος (Εικ. 13).....
- Όχι ευδιάκριτα νύσσοντα μυζητικά στοματικά μόρια, το μήκος της κεφαλής συνήθως μεγαλύτερο απ' ότι το πλάτος..... **Anoplura**
- 22** - Κοιλιά με μεγάλους, μη αρθρωτούς, λαβιδόμορφους κέρκους (Εικ. 14).....
- Είτε δεν υπάρχουν κέρκοι, είτε εάν υπάρχουν είναι αρθρωτοί και δεν είναι λαβιδόμορφοι..... **23**
- 23** - Νηματοειδής κέρκοι με μήκος μεγαλύτερο από εκείνο του συνόλου των τριών τελευταίων κοιλιακών άρθρων..... **24**
- Οι κέρκοι είτε δεν υπάρχουν είτε εάν υπάρχουν δεν είναι νηματοειδής και είναι μικρότεροι σε μήκος από τα τρία τελευταία κοιλιακά άρθρα..... **28**
- 24** - Οι πτέρυγες κρατούνται όρθιες προς τα πάνω παράλληλα με τον κύριο άξονα του σώματος σε έντομα του αναπαύονται. Κεραίες νηματοειδής (Εικ. 15).....
- Πτέρυγες διαφόρων τύπων χωρίς να κρατούνται όρθιες προς τα πάνω. Κεραίες επιμήκης και πτεροειδής (filiform)..... **25**



Εικ. 16. Τύποι ποδιών Ορθοπτέρων. Σκαπτικού (Α), συλληπτικού (Β) και αλτηκού τύπου (Γ).

- 25** - Το σχήμα του πρόσθιου ζεύγους ποδιών διαφορετικό από εκείνο του μεσαίου και του οπίσθιου, συνήθως σκαπτικού ή συλληπτικού τύπου (Εικ. 16)..... **Orthoptera**
- Πρόσθιο ζεύγος ποδιών όμοιο σε μορφή με το μεσαίο και το πίσω ζεύγος..... **26**
- 26** - Το πίσω ζεύγος των ποδιών μεγαλύτερο από τα άλλα δύο, πηδητικού τύπου (Εικ. 16)..... **Orthoptera**
- Το πίσω ζεύγος των ποδιών όμοιο σε μέγεθος και μορφή με το μεσαίο και το πρόσθιο..... **27**
- 27** - Ταρσοί με 3 άρθρα, κέρκοι με πολλά άρθρα, είτε μακριοί είτε κοντοί, όχι όμως λαβιδόμορφοι..... **Plecoptera**
- Ταρσοί ποικίλοι (συνήθως με 4-5 άρθρα). Μεγάλα σε μέγεθος έντομα, συνήθως με καλά ανεπτυγμένες πτέρυγες..... **31**
- 28** - Κέρκοι μικρότεροι σε μέγεθος από τα 3 τελευταία κοιλιακά άρθρα..... **29**
- Δεν υπάρχουν κέρκοι (δεν πρέπει να συγχέονται οι κέρκοι με τον γενετικό οπλισμό)..... **33**
- 29** - Μικρά έντομα, με μη σκληρωτηνισμένο εξοσκελετό, πτέρυγες διάφανες, όμοιες μεταξύ τους σε μορφή και μέγεθος..... **30**
- Ποικίλο σχήμα σώματος, πρόσθιες πτέρυγες διαμορφωμένες σε έλυτρα, ημιέλυτρα ή ψευδέλυτρα **31**

- 30** - Το πρώτο άρθρο του ταρσού (πρώτο ταρσομερές) διογκωμένο σε σχέση με τα άλλα ταρσομερή, διαμορφωμένο σε όργανο για την έκκριση μεταξιού και την ύφανση ιστών..... **Embioptera**
- Το πρώτο άρθρο του ταρσού δεν είναι διογκωμένο..... **Isoptera**

- 31** - Ταρσοί με 4 άρθρα..... **Orthoptera**

- Ταρσοί με 5 άρθρα..... **32**

- 32** - Προθώρακας πολύ μεγαλύτερος από το μεσοθώρακα, πρόσθια πόδια συλληπτικού τύπου..... **Mantodea**


- Ο προθώρακας δεν είναι πολύ μεγαλύτερος από τον μεσοθώρακα, τα πρόσθια πόδια δεν είναι συλληπτικού τύπου..... **Blattaria**

- 33** - Μεγάλου μεγέθους έντομα με 2 ζεύγη πτέρυγες. Πτέρυγες διαφανείς, συνήθως με πολλά κύτταρα και με ένα «γόνατο» στην πρόσθια πλευρά (Εικ. 17)..... **Odonata**


- Πτέρυγες ποικίλου σχήματος, αλλά πάντα χωρίς πρόσθιο «γόνατο» στην πρόσθια παρυφή..... **34**

- 34** - Ένα ζεύγος πτερύγων και συνήθως ένα ζεύγος αλτήρων..... **Diptera**


- Δύο ζεύγη πτερύγων, απουσία αλτήρων..... **35**



Εικ. 17. Πτέρυγα των Odonata. Δικαρίνεται το γόνατο στην πρόσθια παρυφή.




Εικ. 18. Πόδι κολυμβητικού τύπου. Υδρόβια Hemiptera.




Εικ.19. Hemiptera. A) Scutellum, B) Ημιέλυτρο.

- 35** - Στοματικά μόρια με τη μορφή επίμηκες ρύγχους, το οποίο βρίσκεται στο κάτω μέρος της κεφαλής και έχει κατεύθυνση προς το πίσω μέρος του σώματος του εντόμου, δεν υπάρχουν προσακτρίδες **36**
- Στοματικά μόρια διαφορετικά από τα προηγούμενα, υπάρχουν προσακτρίδες.....
- 36** - Πίσω πόδια χωρίς γαμψό νύχι στην άκρη του ταρσού, προσαρμοσμένα για κολύμβηση (Εικ. 18)..... **Hemiptera**
- Πίσω πόδια με γαμψό νύχι στην άκρη του ταρσού..... **37**
- 37** - Το «ρύγχος» ξεκινάει από το πρόσθιο τμήμα της κεφαλής. Οι πρόσθιες πτέρυγες διαμορφωμένες σε ημιέλυτρα (Εικ. 19)..... **Hemiptera**
- Το «ρύγχος» φαίνεται να φύεται από το στέρνο, ανάμεσα από τα πρόσθια πόδια. Οι πρόσθιες πτέρυγες έχουν ομοιόμορφη υφή σε όλο τους το μήκος..... **Homoptera**
- 38** - Στοματικά μόρια ξέοντος μυζητικού τύπου, ευρισκόμενα εντός κονικού ρύγχους..... **Thysanoptera**
- Διαφορετικά από το προηγούμενο.... **39**
- 39** - Οι πρόσθιες πτέρυγες είναι διαφορετικές από τις οπίσθιες. Συνήθως, έχουν σκληρυνθεί και έχουν χάσει τη μεμβρανώδη υφή τους..... **40**
- Οι πρόσθιες πτέρυγες είναι μεμβρανώδεις και δεν έχουν σκληρυνθεί. Επίσης, δεν αποτελούν κάλυμμα για τις οπίσθιες πτέρυγες..... **41**




Εικ. 20. Coleoptera. Διακρίνονται τα έλυτρα (Α).



41

- Οι πρόσθιες, μεσοθωρακικές πτέρυγες έχουν διαμορφωθεί σε έλυτρα, είναι σκληροτηνισμένες, συνήθως σκληρές, χωρίς κάθετες νευρώσεις και εφάπτονται στο μέσον της νωτιαίας πλευράς του θώρακα. Σε οριμένες περιπτώσεις δεν καλύπτουν όλα τα κοιλιακά άρθρα όταν το έντομο παρατηρείται από τη νωτιαία πλευρά. Τα πίσω πόδια συνήθως δεν είναι πηδητικού τύπου (Εικ. 20).....

Orthoptera



Εικ. 21. Σωματικά τμήματα και μορφή Ορθοπτέρων.

41

- Οι πρόσθιες πτέρυγες έχουν εμφανείς νευρώσεις τόσο κατά μήκος όσο και κάθετες, συνήθως αλληλεπικαλύπτονται τουλάχιστον εν μέρει. Τα πίσω πόδια είναι πηδητικού τύπου αρκετά μεγαλύτερα από τα υπόλοιπα (Εικ. 21).....

Embioptera

42

- Το βασικό άρθρο του ταρσού των πρόσθιων ποδιών είναι διογκωμένο και διαμορφωμένο για την παραγωγή μεταξιού και την ύφανση μετάξινων ιστών.....

42

Isoptera

42

- Όλες οι πτέρυγες έχουν ίδιο μέγεθος (τερμίτες).....

- Οι πίσω πτέρυγες συνήθως μικρότερες σε μέγεθος από τις πρόσθιες.....

43

- 43** - Μυζητικού τύπου στοματικά μόρια **Lepidoptera** διαμορφωμένα σε ελικοειδές σιφώνιο. Οι πτέρυγες και το σώμα καλύπτονται συνήθως από λέπια (Εικ. 22).....




Εικ. 22. Κεφαλή ενηλίκου Λεπιδοπτέρου, με μυζητικά στοματικά μόρια (σιφονειδή).

- Στοματικά μόρια διαφορετικά από εκείνα που περιγράφονται στην προηγούμενη πρόταση. Το σώμα δεν καλύπτεται από λέπια τα οποία αν υπάρχουν βρίσκονται μόνο στις πτέρυγες και κυρίως στις νευρώσεις τους.....

44

- 44** - Πολλές κάθετες νευρώσεις στις πτέρυγες και κατά κύριο λόγο κατά μήκους της πρόσθιας παρυφής των πτερύγων. Εάν οι κάθετες νευρώσεις είναι λίγες οι πτέρυγες καλύπτονται από κηρώδεις ουσίες και το σώμα των εντόμων είναι πολύ μικρό (Εικ. 23).....



Εικ. 23. Neuroptera. Διακρίνονται οι κάθετες νευρώσεις στις πτέρυγες (Α).

- Πολύ λίγες κάθετες νευρώσεις στις πτέρυγες. Το σώμα και οι πτέρυγες δεν καλύπτονται από κηρώδεις ουσίες.....

45


- 45** - Στοματικά μόρια ατροφικά υποτυπώδη, διακρίνονται μόνο οι προσακτρίδες. Στις πτέρυγες συνήθως υπάρχουν τρίχες.....

- Στοματικά μόρια ανεπτυγμένα κανονικά, μασητικού τύπου.....

46



Εικ. 24. Hymenoptera.



Εικ. 25. Psocoptera.

46 - Στοματικά μόρια μασητικού τύπου, **Mecoptera**


είναι επιμήκης, διαμορφωμένα σε «ράμφος». Στα αρσενικά ορισμένων ειδών η κοιλιά μοιάζει με εκείνη των σκορπιών.....

- Στοματικά μόρια μασητικού τύπου μη διαμορφωμένα σε ράμφος ή ρύγχος, ή **47**
μασητικού τύπου.....

47 - Οι ταρσοί έχουν 4 ή 5 άρθρα. Οι **Hymenoptera**

πτέρυγες είναι διπλωμένες επίπεδα στην νωτιαία πλευρά του σώματος του εντόμου (μέλισσες, σφήκες, μυρμήγκια κλπ.) (Εικ. 24).....


- Ταρσοί με 2 ή 3 άρθρα. Οι κεραίες είναι διπλωμένες πάνω από το σώμα του εντόμου με τρόπου που θυμίζει σκεπή σπιτιού (Εικ. 25).
Psocoptera





Collembola

Ephemeroptera


Ebioptera




Plecoptera




Psocoptera




Thysanura




Lepidoptera




Neuroptera




Hemiptera




Coleoptera




Hymenoptera



Diptera



Odonata



Orthoptera

